

## 「暴露愛滋病毒後」預防性投藥(PEP)宣導資料

### 一、 宣導動畫短片

(連結：<https://goo.gl/26qf3J>)

<p style="text-align: center;">圖像</p>	
<p>名稱</p>	<p>跟著毛大動次動 毛大陪你談 PEP</p>
<p>內容</p>	<p>PEP 基本認知、安全性行為等。</p>
<p>連結</p>	<p><a href="http://goo.gl/3XiLtw">http://goo.gl/3XiLtw</a></p>

本署全球資訊網:專業版/傳染病介紹/第三類法定傳染病/人類免疫缺乏病毒感染/宣導素材/多媒體

## 二、 暴露愛滋病毒「後」預防性投藥 Q&A

(連結：<http://goo.gl/Wynbh9>)

Q1 什麼是非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥？

A1 非因執行勤務者(醫護人員、警消等)，如有從事危險性行為、共用針器或稀釋液的注射藥癮者等，而有直接接觸到感染者的血液或體液，經愛滋病指定醫院醫師診療後，給予暴露後的抗愛滋病毒預防性投藥。

Q2 暴露愛滋病毒後，感染 HIV 的危險性為何？

A2 一次經皮刺傷而暴露感染 HIV 的血液或體液，傳染的危險性大約為0.3%；一次因黏膜接觸到感染 HIV 的血液或體液，其傳染的危險性則約為0.09%。

Q3 我如何得知我是否該去醫院預防性投藥？

A3 如果與愛滋病毒感染者或不確定對方之感染狀況，有無套性行為或共用針具，或被其咬傷而可見血液，建議至醫院接受專業人員評估，以確定是否需預防性投藥。

Q4 當發生非職業暴露愛滋病毒的血液或體液暴露後，接下來我該怎麼辦？

A4 預防性投藥要愈早愈好，請於事發後72小時內儘速前往提供預防性投藥的醫院進行評估。

Q5 如果已經超過72小時呢？

A5 若已暴露愛滋病毒超過72小時，倘經醫師評估有預防性投藥之必要，亦可投藥，惟超過7天則無預防效果。

Q6 若我在公共場所被丟棄針頭扎傷，我該怎麼辦？

A6 雖未曾造成愛滋病感染的案例發生，但針頭來源有可能是注射藥癮者，仍建議帶著針具儘速前往提供預防性投藥之醫院就醫並評估。

Q7 請問預防性用藥投藥期程？

A7 建議使用28天。

Q8 請問預防性投藥有無副作用？

A8 有的。預防性投藥前，醫療人員會和你充份討論副作用及遵從醫囑的重要性，若中斷服藥，亦可能產生抗藥性。

Q9 我可以因為經常發生非職業暴露愛滋病毒，而多次服用預防性

A9 經常反覆發生非職業暴露愛滋病毒或中斷用藥者，建議應停止預防性投藥，可以透過精神科醫師協助，減少病人對感染的焦慮，以減少不安全性行為並增加服藥順從性。

Q10 請問暴露後預防性投藥費用是公費還是自費？

A10 所有療程，包含所使用的藥物與檢查費用，均為自費。